

# FumiXAN PRO



## Generalidades del producto

Fumixan PRO es un formulado a base de deltametrina de la familia de los piretroides y de un IGR de última generación (regulador de crecimiento de insectos que interrumpe el desarrollo juvenil de los mismos, impidiendo su madurez sexual evitando la reproducción y el crecimiento poblacional).

Fumixan PRO fumígeno produce una nube de humo insecticida con gran capacidad de penetración en sitios de difícil acceso: Fisuras, huecos, rincones, etc.

Tiene rápida acción poder de expulsión, de volteo y repelencia. Es utilizado en todo tipo de construcciones, como viviendas tipo rancho, de madera o mampostería, galpones domiciliarios y depósitos. Su amplio espectro de control permite eliminar insectos rastreros e insectos voladores.

<b>Clasificación</b>	Insecticida
<b>Formulación</b>	Comprimidos fumígenos
<b>Principio activo</b>	Deltametrina 3 g Piriproxifeno 0.2 g
<b>Plagas Domésticas</b>	Insectos rastreros como cucarachas, vinchucas, piojos, hormiga carpintera, chinches, pulgas, alacranes, bicho bolita, arañas, e insectos voladores como moscas, mosquitos, tábanos, polillas, jejenes, y avispas.
<b>Plagas de Salud Pública</b>	Vector de la enfermedad de Chagas: vinchucas ( <i>Triatoma infestans</i> ) Vector de la enfermedad de Dengue y Fiebre Amarilla: <i>Aedes</i> sp. Vector de la enfermedad de Malaria y Paludismo: <i>Anopheles</i> sp.
<b>Presentación</b>	Estuche con 1 comprimido x 50 grs.

## Recomendaciones de uso

Retirar alimentos, utensilios de cocina, vajilla, animales domésticos, plantas, y peceras o acuarios.

Cubrir con papeles, plásticos o telas los elementos de uso personal: ropa de cama, de vestir, etc.

Hermetizar lo máximo posible el ambiente a tratar, cerrando bien las puertas, ventanas, y otras aberturas para evitar la fuga del humo

## Dosis de Uso

Colocar 1 comprimido cada 50 m<sup>3</sup>/20 m<sup>2</sup> a 80 m<sup>3</sup>/34 m<sup>2</sup> (frente x fondo x alto ) en ambientes donde puede lograrse un buen cierre.

Potes fumígenos: Colocar 1 pote cada 200 m<sup>3</sup> (frente x fondo x alto) en ambientes donde puede lograrse un buen cierre.

En recintos o viviendas rurales con muchas aberturas difíciles de cerrar las dosis deberá aumentarse en 1 comprimido cada 25 m<sup>3</sup> y repetir la aplicación luego de 45 días.

## Aplicación

Es obligatorio verificar que no esté presente ninguna persona en el ambiente a tratar a excepción del aplicador quien deberá retirarse de inmediato una vez iniciado el encendido.

Quitar la envoltura plástica y colocar el comprimido sobre una base no combustible (metal, cerámica, ladrillo, etc.) dejando una parte del producto libre para su encendido.

No colocar directamente o cerca de alfombras, superficies de madera o materiales inflamables. Los comprimidos arden sin llama.

Acercar la llama al borde de la base del producto y mantenerla hasta la generación de humo y retirarse del lugar inmediatamente.

En ambientes con muchas aberturas difíciles de cerrar, aplicar más de un comprimido y proceda a encenderlos siempre en dirección a la puerta de salida para no tener que pasar por el área fumigada.

Colocar el cartel de advertencia al retirarse del área fumigada.

Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

Conserve cerrado el lugar tratado por espacio de 2 horas.

Reabrir puertas y ventanas (no respire los humos) y ventilar como mínimo 2 horas antes de habilitar el lugar.

Finalizado el proceso de combustión queda un residuo de mayor tamaño y distinto color que el comprimido original.

En caso de reinfestación deberá repetir el tratamiento a los fines de evitar que continúe el ciclo reproductivo.

Se deberá realizar la limpieza de las superficies tratadas al reingresar prestando especial atención a aquellas que puedan entrar en contacto con alimentos.

