

# FungoXAN



## Generalidades del producto

Es un funguicida sistémico que se absorbe por los tejidos verdes del vegetal al igual que por las raíces, translocándose por la vía ascendente o xilemática. Ejerce su acción en forma preventiva, impidiendo la infección, como así también en forma curativa, interfiriendo en el crecimiento y desarrollo del hongo. Su persistencia, en forma activa, dentro del vegetal es de 2 a 3 semanas.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Clasificación:</b>    | Funguicida  |
| <b>Formulación:</b>      | Suspensión concentrada  |
| <b>Principio activo:</b> | Carbendazim 50%   |
| <b>Plagas:</b>           | Sarna, Torque, sclerotinia sclerotiorum, podredumbre gris, fusariosis, podredumbre de pimpollos, oídio, penicillium spp., rhizoctonia spp, mancha negra del rosal, moho gris. |
| <b>Presentación:</b>     | 30 ml.  |

### Recomendaciones de uso

FUNGOXAN puede aplicarse vía tratamiento foliar mediante pulverización con equipo manual o moto pulverizadora, vía tratamiento radicular por riego, o por inmersión de órganos vegetales. Lograr una buena cobertura del producto sobre el cultivo a tratar. Repetir la aplicación en caso de una lluvia posterior al tratamiento. Usar camisa de manga y pantalón largos, anteojos y guantes protectores. No dejar el producto preparado de un día para el otro. FUNGOXAN es compatible con otros funguicidas e insecticidas.

### Preparación

- 1) En función de la cantidad y tamaño de las plantas a tratar agregue al pulverizador manual o regadera la mitad del volumen total de agua necesaria para provocar una buena cobertura.
- 2) Agitar bien el envase de FUNGOXAN antes de abrirlo.
- 3) Verter la dosis recomendada, según tipo de plaga y cultivo, dentro del tanque del pulverizador o regadera.
- 4) Agregar el resto de agua al pulverizador o regadera, hasta completar el volumen de agua requerido.
- 5) Agitar la mezcla hasta homogeneizar el producto y comenzar a aplicar. Mantener la agitación del producto durante la aplicación.

### Restricciones de uso

Entre la aplicación del producto y la cosecha de las partes comestibles deben transcurrir una cantidad de días no menor a la indicada a continuación: 7 días para durazno, 3 días para frutilla y 7 días para tomate.

### Compatibilidad

FUNGOXAN es compatible con otros funguicidas e insecticidas. NO es compatible con productos altamente alcalinos como polisulfuros, azufres y caldo bordelés, que reducen su actividad

## Dosis

| Cultivo  | Plaga  | Dosis (cm <sup>3</sup> /10 lts. de agua) | Momento de aplicación  |
|--|--|--|--|
| Duraznero  | Sarna<br>( <i>Fusicladium carpophilum</i> )  | 6  | Aplicar una vez formado el fruto y repetir cada 10-20 días en función de las condiciones climáticas.   |
| Duraznero  | Torque<br>( <i>Thaprina deformans</i> )  | 7  | Pulverizar en otoño antes de la caída de las hojas y repetir a principios de primavera al hincharse las yemas.   |
| Tomate   | ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )  | 5-jun                                    | Comenzar a pulverizar cuando se inicie el ataque y repetir cada 15 días.   |
| Frutilla   | Podredumbre gris<br>( <i>botrytis cinerea</i> )  | 5-jun                                    | Realizar tres tratamientos: el primero con el 50% de las flores abiertas, el segundo a la caída de los pétalos y el tercero cuando los frutos comiencen a madurar. |
| Clavel   | ( <i>Fusarium roseum</i> )   | 5-oct                                    | Cuando comiencen los síntomas, comenzar a pulverizar a intervalos de 15 días.  |
| Rosa   | Podredumbre de pimpollos<br>( <i>Botrytis cinerea</i> )  | 2,5-3                                    | Aplicar a partir de los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 15 días.  |
|  | Oídio<br>( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )   |  |  |
| Poinsetia, crisantemo, cineraria, fresia, violeta de los alpes y africana, sansevieria | ( <i>Botrytis cinerea</i> )  | 2,5-3                                    | Aplicar a partir de los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 15 días.  |
| Tulipán, gladiolo y fresias  | ( <i>Penicillium spp.</i> ,<br><i>Fusarium spp.</i> ,<br><i>Botrytis spp.</i> ,<br><i>Rhizoctonia spp.</i> ) | 20                                       | Antes de sembrar, sumergir los bulbos durante 15 minutos en un recipiente con 20 cm <sup>3</sup> cada 10 lts. de agua.   |