

# GlacoXAN D-FORTE



## Generalidades

Es un insecticida concentrado emulsionable formulado a base de DDVP con poder de volteo, Deltametrina y Tetrametrina moléculas de la familia de los piretroides con efecto de expulsión y repelencia y la sinergia del butóxido de piperonilo. Esta combinación nos brinda un producto con efecto de volteo, repelencia, desalojo y choque y acción prolongada por su capacidad residual todo lo cual permite el control plaguicida.

<b>Clasificación</b>	Insecticida.
<b>Formulación:</b>	Concentrado Emulsionable.
<b>Principio activo:</b>	Diclorvos 0.5 g., Deltametrina 1,2 g., Tetrametrina 0.3 g., Butóxido de piperonilo 3 g., Solvente y Emulsionantes c.s.p. 100ml.
<b>Plagas:</b>	Cucarachas, hormigas, insectos de la madera, ácaros, piojillos, chinches, pulgas, garrapatas, bicho bolita, Mosquitos, moscas, tábanos, polillas jejenes y avispas, tábanos, vinchucas, escorpiones y arañas.
<b>Sitios de empleo:</b>	Hospitales, escuelas, restaurantes, casas, instalaciones deportivas, hoteles, depósitos, fábricas, industrias alimenticias, lecherías, granjas avícolas, porquerizas, cabañas, parques.
<b>Dosis:</b>	<u>Insectos rastreros:</u> 80cc a 125cc cada 5 litros de agua para rociar 100 m <sup>2</sup> . <u>Insectos voladores:</u> 50cc a 80cc cada 5 litros de agua para rociar 100 m <sup>2</sup>
<b>Presentación:</b>	1 LT

## Recomendaciones de uso

Pueden utilizarse equipos motorizados, eléctricos o manuales. Valiéndose de un vaso graduado colocar con una pequeña cantidad de agua la dosis indicada de Glacoxan D-FORTE Posteriormente agitar la emulsión para homogenizarla y completar a volumen final con agua. Agítese antes de usar. Prepare sólo la cantidad que necesite para su uso inmediato, no guarde el producto diluido de un día para el otro.

Pulverizar los sitios frecuentados por las plagas, en donde se posan, transitan, refugian, reproducen y en los sitios por donde puedan acceder a los edificios, locales o instalaciones.

No permitir el reingreso hasta tanto las superficies tratadas estén completamente secas y haya transcurrido un plazo mínimo de 4 horas desde el momento de la fumigación.

Rociar paredes, techos, pisos con un pulverizado fino de la mezcla (producto más agua) hasta cubrir las superficies. Utilizar la dosis mayor en caso de superficies porosas o absorbentes y en infestaciones altas.

## Tratamientos espaciales termofogging o niebla fría

Tratamiento en interiores: Cerrar ventanas y puertas. Desconectar los sistemas de ventilación. En lo posible, aplicar con el operario y la máquina fuera de la habitación, de lo contrario, comenzar con el lugar más alejado de la puerta de salida, retrocediendo hacia la misma en el curso de la aplicación.

Cerrar el ambiente por al menos una hora y luego ventilar antes de reingresar. No reingresar con las superficies húmedas.

## Tratamiento en exteriores

Dirigir el cañón del equipo aplicador en forma horizontal. Aplicar cuando la velocidad del viento sea menor a 5 Km/h.

## Dosis recomendadas para termo nebulización tanto en interiores como en exteriores

### Insectos rastreros y voladores

Dosificar 40 cc a 85 cc en el volumen de agua que el equipo requiera para cubrir un ambiente de 1.000 m<sup>3</sup> o una superficie de 10.000 m<sup>2</sup> (una hectárea).