

TermiXAN



Generalidades

Es un rodenticida anticoagulante de tipo monodósico de potente acción sobre ratas y ratones. Los roedores comienzan a morir a partir del tercer día luego de ingerirlo, sin producir recelo dentro de la población ya que la muerte es semejante a la que se produce por vejez o debilidad.

Clasificación:	Rodenticida Raticida.
Formulación:	Cebo a base de grano de cereal.
Principio activo:	Bromadiolone 0,005 %.
Plagas:	Rata negra, rata de Noruega, rata alejandrina, laucha o ratón casero, y ratones de campo.
Presentación:	1 bolsas de 50Grs Cada una.

Recomendaciones de uso

El cebo, sin tocarlo con las manos, debe disponerse en los distintos sitios en los que se observen signos de presencia (deyecciones, pelos, manchas grasosas, objetos roídos, etc.) y en la vecindad de las cuevas, utilizando guantes.

Colocar el cebo dentro de cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas o animales no blanco las cuales además deben ser involucables y proteger el cebo de las condiciones ambientales y dan tranquilidad a los roedores al comer, ya que prefieren hacerlo sin ser observados.

Dosis por cada punto de cebado

Para ratas emplear de 200 a 300 grs. y de 25 a 50 grs para el caso de ratones. La distancia entre cebaderos será de 2 metros para ratones y 8 metros para ratas.

Mantener en forma ininterrumpida la cantidad de cebo limpio y fresco durante 15 días o hasta que desaparezcan los signos de presencia.

AGROINCO
Control de Plagas