

Agrocloprid

Generalidades del producto

COMPOSICIÓN QUÍMICA:


Ingrediente Activo:

1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

Imidacloprid..... 700 g/kg.

Sustancias Inertes 300 g/kg.

Total..... 1000 g/kg.



AGROCLOPRID es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y de forma sistémica. Es un especialista contra insectos chupadores incluidos aquellos vectores de virosis y fitoplasmosis.

INSTRUCCIONES DE USO:

AGROCLOPRID no ofrece ningún inconveniente para su preparación. Para aplicar se debe llenar el tanque de la fumigadora hasta la mitad, verter la cantidad de producto requerido o a usar, agitar y completar el volumen del tanque con agua. Utilizar el equipo de protección adecuado como ser: guantes de nitrilo, lentes o gafas protectoras y barbijo.

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN

AGROCLOPRID se deberá aplicar según el umbral económico para la plaga prevista a controlar.

Para chinches aplicar cuando se obtengan 4 chinches por paño (grano) y 2 chinches por paño (semillas), para el cultivo de la soya, desde el inicio de formación de grano.

Se recomienda no hacer más de 2 aplicaciones por ciclo del cultivo para evitar el surgimiento de resistencia, con un intervalo de 14 días entre ambas.

METODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar por vía terrestre o por vía aérea en alto y bajo volumen con cualquier tipo de aspersor, dependiendo de la cantidad de caldo/ha, y del método de aplicación y de la masa foliar a cubrir.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Evitar realizar la aplicación en las horas más calurosas del día.

Realizar la aplicación preferentemente en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la mañana.

No aplicar si hay amenaza de lluvia inminente.

FITOTOXICIDAD

AGROCLOPRID aplicado a las dosis recomendadas no presenta ningún problema de fitocompatibilidad o fitotoxicidad

ULTIMA APLICACIÓN A LA COSECHA: 21 días.

TIEMPO DE REINGRESO: 48 horas.

LIMITE MAXIMO DE RESIDUOS: 3.5 ppm.



AGROINCO S.R.L.
Todo para el agro

Compatibilidad

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios que se utilizan en el tratamiento de semillas, salvo con aquellos de reacción alcalina

Recomendaciones de Uso

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
SOYA	Chinche verde pequeño (<i>Piezodorus guildinii</i>)	150 gr/ha.

Av. Cristo Redentor entre 6to y 7mo anillo, lado Hipermaxi

Telf. 344-4144

www.agroinco.com.bo

Agroinco SRL



AGROINCO S.R.L.
Todo para el agro